

# I Séries à termes réels ou complexes

## I.1 Définitions de base

**Définition** (Sommes partielles d'une série)

Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  une suite d'éléments de  $\mathbb{K}$ . Soit  $N$  un entier naturel.

On appelle *somme partielle* d'indice  $N$  de la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  la quantité  $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$ .

**Définition** (Convergence ou divergence d'une série)

Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $\mathbb{K}$ . On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  (ou la série de terme général  $u_n$ ) est *convergente* si la suite  $(S_N)$  de ses sommes partielles est convergente.

Dans le cas contraire, on dit que la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est *divergente*.

**Définition** (Somme d'une série convergente)

Soit  $\sum_{n \geq 0} u_n$  une série convergente.

La quantité  $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$  est notée  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$  et est appelée *somme* de la série.

**Définition** (Reste d'ordre  $N$  d'une série convergente)

Soit  $\sum_{n \geq 0} u_n$  une série de  $\mathbb{K}$ , convergente, de somme  $S$ . Soit  $N$  un entier naturel.

On appelle *reste d'ordre  $N$*  de cette série la quantité notée  $R_N$  et égale à  $R_N = S - S_N$ .

Cette quantité est notée  $\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$ .

### Remarques

– Par définition de la convergence d'une série, on a  $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N = 0$ .

Mais attention : on ne doit pas dire qu'une série est convergente  $\Leftrightarrow$  son reste d'indice  $N$  tend vers 0, car l'existence même de ce reste suppose *déjà* que la série est convergente.

– Si la suite  $(u_n)$  de  $\mathbb{K}$  n'est définie que pour  $n \geq k$  on peut se ramener à ce qui précède en posant, si  $0 \leq n < k$ ,  $u_n = 0$ .

En cas de convergence, la somme de la série est alors notée  $\sum_{n=k}^{\infty} u_n$ .

– L'unicité de la limite implique l'unicité de la somme d'une série convergente.

– Avec les notations précédentes, on a  $u_0 = S_0$  et,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = S_n - S_{n-1}$ .

La suite  $(u_n)$  est donc à son tour déterminée par la donnée des sommes partielles  $(S_n)$ .

– Déterminer la *nature* d'une série, c'est dire si elle est convergente ou divergente.

C'est un problème différent que de calculer sa somme en cas de convergence.

Parfois les deux problèmes peuvent être traités simultanément.

L'énoncé pourra demander de prouver la convergence, puis de calculer la somme.

Enfin il est fréquent qu'on puisse prouver qu'une série est convergente mais qu'on soit incapable d'en calculer la somme.

- On ne modifie pas la nature de  $\sum_{n \geq 0} u_n$  en changeant la valeur d'un nombre fini de  $u_n$ .  
En revanche, s'il y a convergence, on modifie en général la somme de cette série.

## I.2 Premiers exemples

- *Série géométrique* :

La série  $\sum_{n \geq 0} a^n$ , où  $a$  appartient à  $\mathbb{C}$ , converge  $\Leftrightarrow |a| < 1$ .

On a alors  $\sum_{n=k}^{\infty} a^n = \frac{a^k}{1-a}$  et en particulier  $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$ .

- *Série harmonique* : la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  est divergente.

- *Série harmonique alternée* :

La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  est convergente, de somme  $\ln 2$ .

- *Série des*  $\frac{1}{n(n+1)}$  : la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$  est convergente, de somme 1.

- *Série des*  $\frac{1}{n^2}$  : la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  est convergente, de somme  $\frac{\pi^2}{6}$ .

- *Série exponentielle* :

Pour tout  $x$  réel, la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$  est convergente, et sa somme est  $e^x$ .

## I.3 Propriétés des séries convergentes

**Proposition** (Convergence des séries à termes complexes)

La série complexe  $\sum_{n \geq 0} z_n$  est convergente  $\Leftrightarrow$  les séries réelles  $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Re} z_n$  et  $\sum_{n \geq 0} \operatorname{Im} z_n$  le sont.

On a alors :  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re} z_n + i \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Im} z_n$ .

**Proposition** (Une condition nécessaire de convergence)

Si la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est convergente, alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ . Attention la réciproque est fautive !

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$  n'existe pas ou est non nulle, la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est dite *grossièrement divergente*.

**Proposition** (*Combinaisons linéaires de séries convergentes*)

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $\mathbb{K}$ . Soient  $\lambda$  et  $\mu$  dans  $\mathbb{K}$ .

Si les séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont convergentes, alors la série  $\sum_{n \geq 0} (\lambda u_n + \mu v_n)$  est convergente

et on a l'égalité :  $\sum_{n \geq 0} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n \geq 0} u_n + \mu \sum_{n \geq 0} v_n$ .

**Remarques**

– Si  $\lambda \neq 0$ , les séries  $\sum_{n \geq 0} (\lambda u_n)$  et  $\sum_{n \geq 0} u_n$  sont de même nature.

– Si  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont de natures différentes, alors  $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$  est divergente.

– Il est possible que  $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$  soit convergente alors que ni  $\sum_{n \geq 0} u_n$  ni  $\sum_{n \geq 0} v_n$  ne le sont.

On ne développera donc pas  $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$  sans vérifier la convergence de  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$ .

**Proposition** (*Etude d'une suite ramenée à l'étude d'une série*)

Une suite  $(u_n)$  de  $\mathbb{K}$  a même nature (CV ou DV) que la série  $\sum_{n \geq 0} (u_{n+1} - u_n)$ .

En cas de convergence, on a :  $\sum_{n=0}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \right) - u_0$ .

**Remarque**

Cette propriété ramène l'étude de la suite  $(u_n)$  à celle de la série  $\sum_{n \geq 0} (u_{n+1} - u_n)$ .

Elle permet aussi d'étudier des séries  $\sum_{n \geq 0} v_n$ , et souvent d'en calculer la somme, si le terme général  $v_n$  peut s'écrire sous la forme  $v_n = u_{n+1} - u_n$ .

**Proposition** (*Critère de Cauchy pour la convergence d'une série*)

Soit  $(u_n)$  une suite de  $\mathbb{K}$ . La série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est convergente si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tq : } \forall m \geq N, \forall n \geq N, \left| \sum_{k=m}^{k=n} u_k \right| \leq \varepsilon.$$

Ce critère peut encore s'écrire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tq : } \forall n \geq N, \forall p \geq 0, \left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k \right| \leq \varepsilon.$$

## I.4 Convergence absolue

**Définition**

Soit  $(u_n)$  une suite de  $\mathbb{K}$ .

La série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est dite *absolument convergente* si la série  $\sum_{n \geq 0} |u_n|$  est convergente.

**Proposition**

Si  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est absolument convergente, alors elle est convergente.

On a alors l'inégalité :  $\left| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|$ .

**Remarque et définition**

La réciproque de la propriété précédente est fausse.

Toute série convergente sans être absolument convergente est dite *semi-convergente*.

**Proposition** (*Produit de deux séries absolument convergentes*)

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $\mathbb{K}$ . On définit la suite  $(w_n)$  de  $\mathbb{K}$  par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \cdots + u_{n-1} v_1 + u_n v_0 = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}.$$

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} w_n$  est le *produit de Cauchy* des séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$ .

Si les deux séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont absolument convergentes, alors la série  $\sum_{n \geq 0} w_n$  est

absolument convergente et on a :  $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n \sum_{n=0}^{\infty} v_n$ .

## I.5 Séries alternées

**Définition**

Soit  $(u_n)$  une suite de  $\mathbb{R}$ .

On dit que la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est *alternée* si le signe de  $(-1)^n u_n$  est constant.

**Proposition** (*Critère spécial des séries alternées*)

Si la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est une série alternée, et si la suite de terme général  $|u_n|$  tend vers 0 en décroissant, alors la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est convergente.

Si on note  $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$  la somme partielle d'indice  $N$  et  $R_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$  le reste d'ordre  $N$  :

- Les suites  $(S_{2N})$  et  $(S_{2N+1})$  sont adjacentes, et convergent vers la somme de la série.
- $R_N$  possède le signe de  $u_{N+1}$ .
- On a l'inégalité  $|R_N| \leq |u_{N+1}|$ .