

## II Séries à termes positifs

### Remarques

- Les hypothèses  $u_n \geq 0$  ou  $u_n \leq v_n$  ci-dessous, vraies à priori pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , peuvent n'être vraies qu'à partir d'un certain rang  $n_0$  : les résultats sur la *nature* des séries (pas sur leur *valeur*) restent valables.
- Compte tenu du fait que les séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} (-u_n)$  sont de même nature, les énoncés suivants s'appliquent aussi, avec des modifications évidentes, au cas des séries réelles dont le terme général garde un signe constant à partir d'un certain rang.
- Les propriétés des séries à termes positifs sont très utiles pour étudier la convergence absolue de séries à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

### Proposition (Convergence par majoration des sommes partielles)

Soit  $(u_n)$  une suite de  $\mathbb{R}^+$ . La série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est convergente  $\Leftrightarrow$  la suite  $(S_N)$  de ses sommes partielles, qui est croissante, est majorée.

En cas de convergence, on a l'égalité :  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sup_{N \geq 0} (S_N)$

### Proposition (Convergence par domination)

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $\mathbb{R}^+$ . On suppose que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ .

- Si la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  diverge, alors la série  $\sum_{n \geq 0} v_n$  diverge.
- Par conséquent, si la série  $\sum_{n \geq 0} v_n$  converge, alors la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.

Dans ce cas, on a alors :  $\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=N}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} v_n$ .

### Proposition (Convergence par équivalence ou par prépondérance)

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $\mathbb{R}^+$ .

Si  $u_n = O(v_n)$  et si la série  $\sum_{n \geq 0} v_n$  converge, alors la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.

Si  $u_n \sim v_n$ , alors les séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont de même nature.

### Remarque

Dans la proposition " $u_n \sim v_n \Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  sont de même nature", il est essentiel que les termes généraux  $u_n$  et  $v_n$  gardent un signe constant quand  $n \rightarrow \infty$ .

Exemple : avec  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  et  $v_n = \ln(1 + u_n)$ .

On a  $u_n \sim v_n$  mais  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge et  $\sum_{n \geq 0} v_n$  diverge.

**Proposition** (Somme des relations de comparaison)

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites de  $\mathbb{R}^+$ .

Notons  $S_N$  et  $S'_N$  les sommes partielles des séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$ .

De même notons  $R_N$  et  $R'_N$  les restes d'ordre  $N$ .

En cas de convergence des séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$ , on a :

- Si  $u_n = o(v_n)$  alors  $R_N = o(R'_N)$ .
- Si  $u_n \sim v_n$  alors  $R_N \sim R'_N$ .

En cas de divergence des séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq 0} v_n$ , on a :

- Si  $u_n = o(v_n)$  alors  $S_N = o(S'_N)$ .
- Si  $u_n \sim v_n$  alors  $S_N \sim S'_N$ .

**Proposition** (Séries de référence)

- *Séries de Riemann* : La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$  est convergente  $\Leftrightarrow \alpha > 1$ .
- *Séries de Bertrand* : La série  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$  converge  $\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1, \beta > 1 \end{cases}$

**Proposition** (Utilisation des séries de référence de Riemann)

- S'il existe  $\alpha > 1$  et  $M \geq 0$  tels que  $0 \leq n^\alpha u_n \leq M$ , alors la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  converge.

C'est le cas notamment si  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha u_n = 0$ , ce qu'on peut traduire par  $u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ .

- S'il existe  $M > 0$  tel que  $nu_n \geq M$ , alors  $\sum_{n \geq 0} u_n$  diverge.

C'est le cas notamment si  $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = \lambda > 0$  c'est-à-dire si  $u_n \sim \frac{\lambda}{n}$ .

**Proposition** (Règles de d'Alembert)

Soit  $(u_n)$  une suite de  $\mathbb{R}^{+*}$ . On suppose que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \alpha$ .

- Si  $0 \leq \alpha < 1$ , la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est convergente.

- Si  $\alpha > 1$ , la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est divergente.

- Si  $\alpha = 1$  on ne peut rien dire : c'est le cas *douteux* de la règle de d'Alembert.

Toutefois, si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1^+$ , alors la série  $\sum_{n \geq 0} u_n$  est divergente.