

## Monotonie et nature

## Enoncés

## EXERCICE 1

Dans cet exercice,  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite réelle telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \leq 3 + \frac{7}{n} \quad (1)$$

- a) Prouver que si elle est croissante  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge et donner un majorant de sa limite.  
b) On suppose que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \geq 3 - \frac{(-1)^n}{n}. \quad (2)$$

Que peut-on en déduire ?

## EXERCICE 2

Soit  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $w_0 \in \mathbb{R}$  et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = \frac{w_n^2 + 1}{2}$$

- 1) Prouver que la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet une limite.
- 2) Préciser, selon la valeur de  $w_0$ , la limite de la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**EXERCICE 3**

Soit la suite  $(U_n)_{n \geq 2}$  définie par :

$$\forall n \geq 2, U_n = \left(1 - \frac{2}{n^2}\right)^{3n^2}$$

Déterminer la limite de  $(U_n)_{n \geq 2}$ .

## Correction

## EXERCICE 1

a) On a :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{7}{n} \leq 7$

Donc :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, U_n \leq 10$

Ainsi,  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est croissante et majorée donc  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge. Notons  $l$  sa limite. En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  dans la relation (1), on obtient alors, comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{n} = 0$  :

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge, et sa limite est inférieure ou égale à 3.

b) D'après (1) et (2), on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 3 - \frac{(-1)^n}{n} \leq U_n \leq 3 + \frac{7}{n}$$

Comme  $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est bornée et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

On a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$ , et donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ 3 - \left( \frac{-1}{n} \right)^n \right] = 3$

Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ 3 + \frac{7}{n} \right] = 3$ , on peut alors écrire, d'après le théorème d'existence d'une limite par encadrement :

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$

## EXERCICE 2

1) On a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} - w_n &= \frac{w_n^2 + 1}{2} - w_n && \text{soit encore :} \\ &= \frac{w_n^2 + 1 - 2w_n}{2} && \text{d'où :} \\ &= \frac{(w_n - 1)^2}{2} && \text{et donc :} \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} - w_n \geq 0.$$

Ainsi la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante, ce qui nous permet de conclure :

La suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet une limite

2) Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 1}{2}$ . On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = f(w_n).$$

$f$  étant continue sur  $\mathbb{R}$ , si la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, alors sa limite  $\ell$  est solution de l'équation  $\ell = f(\ell)$ . Or on a :

$$\begin{aligned} \ell = f(\ell) &\Leftrightarrow \ell = \frac{\ell^2 + 1}{2} && \text{soit encore :} \\ &\Leftrightarrow \frac{\ell^2 + 1}{2} - \ell = 0 && \text{d'où} \\ &\Leftrightarrow \frac{(\ell - 1)^2}{2} = 0 && \text{soit finalement :} \\ &\Leftrightarrow \ell = 1. \end{aligned}$$

Ainsi, la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne peut converger que vers 1. Etudions alors les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme fonction polynôme, et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = x.$$

On peut alors dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	-	$0$	+
$f$	$+\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

Deux cas se présentent alors :

- Si  $w_0 \in [-1, 1]$ . Comme  $f([-1, 1]) \subset [-1, 1]$ , on obtient alors, par récurrence :  
 $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \in [-1, 1]$ .

Dans ce cas, la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est donc croissante et majorée, donc convergente et, d'après le résultat précédent, converge vers 1,

- Si  $w_0 \notin [-1, 1]$ . Comme :  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1], f(x) \in ]1, +\infty[$ , on prouve alors, en raisonnant par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, w_n \in ]1, +\infty[$ .

Etant croissante et comme  $w_1 > 1$ , la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne peut donc converger vers 1 (contraposée du théorème de prolongement des inégalités), ce qui nous permet d'écrire que la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge. Comme elle admet une limite et comme ses termes (à l'exception éventuelle de  $w_0$ ) sont positifs, elle diverge donc vers  $+\infty$ .

On peut finalement conclure :

Si  $w_0 \in [-1, 1]$ , la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 1  
 Si  $w_0 \notin [-1, 1]$ , la suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge vers  $+\infty$ .

N.B. : En supposant la convergence de la suite  $w$ , on pouvait également passer à la limite dans l'égalité  $w_{n+1} = \frac{w_n^2 + 1}{2}$  pour montrer qu'elle ne peut converger que vers 1.

### EXERCICE 3

On a :

$$\forall n \geq 2, 1 - \frac{2}{n^2} > 0$$

Et donc :

$$\begin{aligned} \forall n \geq 2, u_n &= \exp \left[ 3n^2 \ln \left( 1 - \frac{2}{n^2} \right) \right] \\ &= \exp \left[ -6 \cdot \frac{\ln \left( 1 - \frac{2}{n^2} \right)}{-\frac{2}{n^2}} \right]. \end{aligned}$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ , et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{-2}{n^2} \right) = 0$ ,

$$\text{On a : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln \left( 1 - \frac{2}{n^2} \right)}{-\frac{2}{n^2}} \right) = 1$$

$$\text{Et donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ -6 \frac{\ln \left( 1 - \frac{2}{n^2} \right)}{-\frac{2}{n^2}} \right] = -6$$

exp étant continue en  $-6$ , on peut conclure :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{-6}$$

N.B. : On pouvait également déterminer un équivalent de  $3n^2 \ln\left(1 - \frac{2}{n^2}\right)$  au voisinage de  $+\infty$  pour déterminer sa limite  $-6$ .