



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
Direction des Admissions et Concours

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PARIS
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON

CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION SCIENTIFIQUE

MATHEMATIQUES II

Samedi 25 Avril 1998, de 8 h à 12 h

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs. Ils ne doivent faire usage d'aucun document; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Notations

Dans tout le problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 2.

Toutes les variables aléatoires, considérées dans chaque partie de ce problème, sont des variables aléatoires définies sur un même espace de probabilité (Ω, \mathcal{A}, P) .

X étant une variable aléatoire admettant des moments d'ordre 1 et 2, $E(X)$ désigne l'espérance de X , $V(X)$ sa variance.

Tous les couples (X, Y) de variables aléatoires à densité considérés dans ce problème sont tels que X et Y admettent des moments d'ordre 1 et 2 et le produit XY est une variable aléatoire à densité admettant un moment d'ordre 1. On définit alors la covariance de X et Y par:

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

et on admet que cette covariance vérifie les propriétés suivantes :

1) $\text{cov}(\alpha X + \beta Y, Z) = \alpha \text{cov}(X, Z) + \beta \text{cov}(Y, Z)$

2) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$

3) $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)V(Y)}$

4) si X et Y sont indépendantes, alors $\text{cov}(X, Y) = 0$

où α et β sont des réels, X , Y et Z des variables aléatoires à densité.

Ces propriétés ne doivent pas être démontrées.

LES
ANNALES
DES
HEC

Un gestionnaire investit un capital parmi n actifs, notés A_1, A_2, \dots, A_n (par exemple des actions), disponibles sur le Marché Boursier. Les rendements à un an de ces actifs, exprimés en pourcentage, sont des variables aléatoires R_1, R_2, \dots, R_n admettant des moments d'ordre 1 et 2. Par exemple, si l'actif A_1 a rapporté 6%, R_1 prend la valeur 6.

Le gestionnaire constitue un portefeuille, c'est-à-dire un n -uplet (x_1, x_2, \dots, x_n) tel que, pour tout i de $\{1, \dots, n\}$, x_i est un réel positif ou nul et tel que : $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Chaque coefficient x_i représente la proportion du capital investie dans l'actif A_i .

Par exemple, si n vaut 3 et si le gestionnaire investit un quart du capital dans l'actif A_1 , la moitié du capital dans l'actif A_2 et le quart du capital dans l'actif A_3 , le portefeuille vaut $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

Si (x_1, x_2, \dots, x_n) est un portefeuille donné, le rendement (en pourcentage) de ce portefeuille est la variable aléatoire :

$$R = \sum_{i=1}^n x_i R_i .$$

Notre gestionnaire prudent désire minimiser les risques et recherche pour cela les portefeuilles dont le rendement R est de variance minimale, sous certaines hypothèses.

LES
ANNALES
DES
HEC

Préliminaire

On considère le portefeuille : $Q = (x_1, \dots, x_n)$ et son rendement : $R = \sum_{i=1}^n x_i R_i$. On rappelle que la variance de R est :

$$V(R) = \sum_{i=1}^n x_i^2 V(R_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \text{cov}(R_i, R_j) .$$

1) On suppose, dans un programme Pascal, avoir défini :

Const $n = 5$;

Type $Tab = \text{Array}[1..n]$ of *real*;

var $A : \text{Array}[1..n, 1..n]$ of *real*;

où $A[i, j]$ représente $\text{cov}(R_i, R_j)$.

Ecrire une fonction V de type *real* de paramètre le portefeuille Q de type Tab qui renvoie la valeur de $V(R)$.

2) On considère l'ensemble : $H = \{ (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \}$. On admet que H est fermé.

On définit sur \mathbb{R}^n , la fonction $F : F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 V(R_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \text{cov}(R_i, R_j)$.

Montrer que F admet un minimum sur H .

La suite du problème consiste à déterminer ce minimum et les points de H où ce minimum est atteint, pour répondre ainsi à la demande du gestionnaire prudent.

Partie 1

Dans cette partie, l'entier n vaut 2 et les rendements des actifs A_1 et A_2 sont notés respectivement X et Y .
On suppose : $V(X) = 12$, $V(Y) = 3$, $cov(X, Y) = c$, où c est un réel donné.

Pour un réel a de $[0, 1]$, on considère le portefeuille $(a, 1-a)$ dont le rendement est la variable aléatoire :
 $R = aX + (1-a)Y$.

1) Montrer que l'on a : $|c| \leq 6$.

2) a) Montrer que l'on a : $V(R) = (15-2c)a^2 + 2(c-3)a + 3$.

b) On définit sur \mathbb{R} la fonction h par : $h(x) = (15-2c)x^2 + 2(c-3)x + 3$. Etudier les variations de h sur $[0, 1]$, en distinguant les deux cas : $c \in [-6, 3]$ et $c \in [3, 6]$. Montrer qu'il existe un unique portefeuille dont le rendement est de variance minimale. On déterminera ce portefeuille en fonction de c .

3) a) On suppose : $c = -6$.

Déterminer le portefeuille dont le rendement R est de variance minimale et cette variance minimale. Que peut-on dire de la variable aléatoire R dans ce cas ?

b) On suppose que les variables X et Y sont indépendantes. Montrer que $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$ est le portefeuille de rendement de variance minimale.

4) On suppose dans cette question que X et Y sont des variables gaussiennes indépendantes, X de moyenne égale à 6 et de variance égale à 12, Y de moyenne égale à 3 et de variance égale à 3.

Soit R le rendement du portefeuille $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$. Quelle est la loi de R ? Calculer la probabilité que R soit supérieur ou égal

à 4. (On donne : $\Phi(\frac{1}{\sqrt{15}}) = 0,60$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite).

5) On suppose dans cette question que les variables à densité X et Y sont indépendantes. On suppose de plus que X suit la loi uniforme sur $[0, 12]$ et que Y suit la loi uniforme sur $[0, 6]$.

a) Donner les valeurs des espérances de ces variables et vérifier : $V(X) = 12$, $V(Y) = 3$.

b) Déterminer la loi de la variable $4Y$, puis la densité de la variable $X + 4Y$. Tracer le graphe de cette densité.

c) Soit R le rendement du portefeuille $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$. Calculer la probabilité que R soit supérieur ou égal à 4.

Partie 2

Dans cette partie, n vaut 3 et les rendements des actifs A_1 , A_2 et A_3 sont notés respectivement X , Y et Z .

On suppose de plus : $V(X) = 2$, $V(Y) = V(Z) = 6$, $cov(X, Y) = -1$, $cov(X, Z) = 2$, $cov(Y, Z) = 1$.

On considère le portefeuille (x, y, z) dont le rendement est la variable : $R = xX + yY + zZ$.

La fonction f , l'ensemble K et l'ensemble K_0 sont définis comme suit :

pour tout (x, y) de \mathbb{R}^2 , $f(x, y) = 4x^2 + 10y^2 + 4xy - 8x - 10y + 6$,

$K = \{ (x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2, x + y \leq 1 \}$, $K_0 = \{ (x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2, x + y < 1 \}$. On admet que K_0 est ouvert.

1) Montrer que le problème du gestionnaire revient à déterminer le minimum de f sur K . Dessiner le domaine K .

2) a) Montrer que f admet un minimum local sur \mathbb{R}^2 atteint au point (x_0, y_0) que l'on déterminera.

b) En déduire que f n'admet pas de minimum sur K_0 .

3) a) On pose : $K_1 = \{ (0, y), y \in [0, 1] \}$, $K_2 = \{ (x, 0), x \in [0, 1] \}$, $K_3 = \{ (x, 1-x), x \in [0, 1] \}$.

Déterminer les minimums de f respectivement sur K_1 , K_2 et K_3 .

b) En déduire l'unique portefeuille dont le rendement est de variance minimale.

Partie 3

Dans cette partie, n vaut 3 et les rendements des actifs A_1 , A_2 et A_3 sont notés respectivement X , Y et Z .

1) On suppose : $V(X) = V(Y) = V(Z) = 1$, $cov(X, Y) = cov(X, Z) = cov(Y, Z) = c$, où c est un réel donné.

a) Calculer $V(X + Y + Z)$; Montrer que l'on a : $c \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$.

b) On suppose : $c \neq 1$. On considère un portefeuille (x, y, z) de rendement R .

Montrer que l'on a : $V(R) = (1 - c) \left[\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{3}\right)^2 \right] + \frac{1 + 2c}{3}$.

Déterminer le portefeuille dont le rendement est de variance minimale.

2) Soit A, B, C des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans \mathbb{N}^* suivant toutes la loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$; on a donc : pour tout k de \mathbb{N}^* , $P(A = k) = P(B = k) = P(C = k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

On suppose que les variables X, Y et Z vérifient :

$$\begin{cases} X = B + C \\ Y = A + C + 1 \\ Z = A + B + 2 \end{cases}$$

a) Déterminer les espérances, variances et covariances des variables X, Y et Z .

b) Montrer que le portefeuille de rendement de variance minimale est $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

c) Déterminer la loi de $A+B+C$. En déduire la probabilité que le rendement R du portefeuille ci-dessus soit supérieur ou égal à 5.

Partie 4

Dans cette partie, n est un entier supérieur ou égal à 2.

On note M la matrice de covariances de R_1, \dots, R_n , matrice carrée d'ordre n dont le coefficient de la ligne i et de la colonne j est égal à $cov(R_i, R_j)$.

On note $M_{n,1}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles ayant n lignes et 1 colonne.

1) On considère un élément de $M_{n,1}(\mathbb{R})$: $U = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et la variable aléatoire : $T = \sum_{i=1}^n x_i R_i$.

Vérifier que l'on a : $V(T) = {}^t U M U$, où ${}^t U$ désigne la transposée de U .

2) a) Montrer que M est diagonalisable.

b) A l'aide du 1), montrer que les valeurs propres de M sont positives ou nulles.

3) On suppose M inversible. Pour tout (U, W) de $(M_{n,1}(\mathbb{R}))^2$, on pose $\varphi(U, W) = {}^t U M W$

a) Montrer : si ${}^t U M U = 0$, alors $U = 0$.

b) Montrer que φ est un produit scalaire. On note N la norme associée à ce produit scalaire.

c) Montrer : pour tout (U, W) de $(M_{n,1}(\mathbb{R}))^2$, $\left[N\left(\frac{U+W}{2}\right) \right]^2 = \frac{1}{2} \left[(N(U))^2 + (N(W))^2 \right] - \left[N\left(\frac{U-W}{2}\right) \right]^2$.

d) En déduire l'unicité du portefeuille dont le rendement est de variance minimale (l'existence ayant été montrée dans le préliminaire).