

## Énoncé

1) Soit  $E$  l'ensemble des fonctions réelles  $g$  de classe  $C^1$  sur  $[0, 1]$  et telles que :

$$\forall x \in [0,1], g'(x) = g(x - x^2).$$

Montrer que  $E$  est un espace vectoriel.

2) Soient  $A = \begin{pmatrix} 10 \\ 00 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 01 \\ 10 \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 00 \\ 01 \end{pmatrix}$ . On note :

$$E = \left\{ M \in M_2(\mathbb{R}), \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, M = aA + bB + cC \right\}.$$

Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

## Correction

1) Notons  $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$  l'espace vectoriel des fonctions de classe  $C^1$  sur  $[0, 1]$  et  $\theta$  la fonction nulle sur  $[0, 1]$ . Soit alors  $g$  un élément de  $E$ .  $g$  étant de classe  $C^1$  sur  $[0, 1]$ , on a  $g \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ .

Ainsi,  $E$  est inclus dans  $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ . De plus, on a :

- $\forall x \in [0, 1], \theta'(x) = 0$ , donc :  $\forall x \in [0, 1], \theta'(x) = \theta'(x - x^2)$ . Ainsi,  $\theta \in E$ , et donc :  $E \neq \emptyset$ ,
- Soient  $g$  et  $h$  deux éléments de  $E$  et  $\lambda$  un réel quelconque.  $g + \lambda h$  est de classe  $C^1$  sur  $[0, 1]$  comme somme de fonctions de classe  $C^1$  sur  $[0, 1]$ , et on a  $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$  étant un espace vectoriel :

$\forall x \in [0, 1], (g + \lambda h)'(x) = g'(x) + \lambda h'(x)$  soit, par définition de  $E$  :

$$\begin{aligned} &= g'(x - x^2) + \lambda h'(x - x^2) \quad \text{d'où, } \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \text{ étant un espace vectoriel :} \\ &= (g + \lambda h)'(x - x^2) \quad \text{i.e. :} \end{aligned}$$

$(g + \lambda h) \in E$ .

Ainsi  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ . On peut donc conclure :

$E$  est un espace vectoriel

2) On a :  $(A, B, C) \in (\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))^3$  et, par définition de  $E$  :  $E = \text{Vect}(A, B, C)$ . Ainsi :

$E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel