

## Approximations de $\pi$ à l'aide de développements limités

Au dix-septième siècle, des mathématiciens comme Huyghens et Snellius entreprirent de calculer des valeurs décimales approchées de  $\pi$  par des méthodes trigonométriques élémentaires. Il s'agissait d'améliorer la double inégalité classique  $\sin x < x < \tan x$  valable sur  $]0, \frac{\pi}{2}[$  en introduisant des fonctions :

- Qui s'expriment simplement à l'aide des fonctions trigonométriques usuelles.
- Peu différentes de  $x$  au voisinage de 0.

Les fonctions  $f_1$  et  $f_4$  de l'énoncé sont celles de Snellius ;  $f_2$  et  $f_3$  sont celles de Huyghens.

1. Soient  $a, b$  des réels positifs ou nuls. On pose  $m(a, b) = \frac{2a+b}{3}$  et  $g(a, b) = \sqrt[3]{a^2b}$ .  
Comparer  $m(a, b)$  et  $g(a, b)$ . [S]

2. Dans toute la suite, on définit les fonctions suivantes sur  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  :

$$f_1(x) = \frac{3 \sin x}{2 + \cos x}, \quad f_2(x) = \frac{1}{3} \left( 8 \sin \frac{x}{2} - \sin x \right)$$

$$f_3(x) = \sqrt[3]{\sin^2 x \tan x}, \quad f_4(x) = \frac{1}{3} (2 \sin x + \tan x)$$

Calculer les développements limités en 0 de ces fonctions, à l'ordre 5.

En déduire l'existence de  $\eta > 0$  tel que :  $\forall x \in ]0, \eta[, f_1(x) < f_2(x) < x < f_3(x) < f_4(x)$ .  
[S]

3. On suppose ici que  $x$  appartient à  $I = ]0, \frac{\pi}{2}[$ . Quel est le signe de  $f_4(x) - f_3(x)$ ? [S]

4. On pose  $u(x) = 3(2 + \cos x)(f_2(x) - f_1(x))$ . Linéariser  $u(x)$ .

Montrer que  $u'(x) = P(\cos \frac{x}{2})$ , où  $P$  est un polynôme de degré 4. Factoriser  $P$ .

En déduire, pour  $x$  dans  $I$ , le signe de  $u'(x)$  puis celui de  $f_2(x) - f_1(x)$ . [S]

5. On pose  $v(x) = x - f_2(x)$ . Montrer que  $v'(x) = Q(\cos \frac{x}{2})$ , où  $Q$  est un polynôme.

En déduire, pour  $x$  dans  $I$ , le signe de  $v'(x)$  puis celui de  $v(x)$ . [S]

6. On pose  $w(x) = f_3(x) - x$ . Calculer et factoriser  $w'(x)$ .

En déduire, pour  $x$  dans  $I$ , le signe de  $w(x)$ .

Quelle suite d'inégalités les questions 3 à 6 permettent-elles d'obtenir sur  $I$ ? [S]

7. Seules les valeurs des fonctions trigonométriques de  $\frac{\pi}{4}$  et  $\frac{\pi}{6}$  sont supposées connues.

Calculer des expressions simples de  $\cos \frac{\pi}{12}$ ,  $\sin \frac{\pi}{12}$  et  $\tan \frac{\pi}{12}$ .

Faire de même avec  $\sin \frac{\pi}{24}$  à l'aide de radicaux superposés.

Calculer les expressions par radicaux de  $X = 12f_2(\frac{\pi}{12})$  et de  $Y = 12f_3(\frac{\pi}{12})$ .

En déduire un encadrement de  $\pi$ . [S]

## Corrigé du problème

1. Pour comparer  $m(a, b)$  et  $g(a, b)$ , on factorise  $m^3(a, b) - g^3(a, b)$  :

$$\begin{aligned} m^3(a, b) - g^3(a, b) &= \frac{1}{27}(8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3 - 27a^2b) \\ &= \frac{1}{27}(8a^3 - 15a^2b + 6ab^2 + b^3) = \frac{1}{27}(a - b)^2(8a + b) \end{aligned}$$

Si  $a \neq b$ , alors  $8a + b > 0$ . On en déduit  $m^3(a, b) > g^3(a, b)$  donc  $m(a, b) > g(a, b)$ .

Bien sûr, si  $a = b$  alors  $m(a, b) = g(a, b)$ . [Q]

2. Remarque : les fonctions  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  sont impaires. Les développements limités seront donc de la forme  $f_k(x) = ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5)$ .

– Développement limité de  $f_1$  à l'origine :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 3 \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)}{3 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)} \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{72} + o(x^5)\right)^{-1} \\ &= x \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{72} + o(x^4)\right) \\ &= x \left(1 + x^4 \left(\frac{1}{72} - \frac{1}{36} + \frac{1}{120} + o(x^4)\right)\right) = x \left(1 - \frac{x^4}{180} + o(x^4)\right) \end{aligned}$$

On a donc obtenu :  $f_1(x) = x - \frac{x^5}{180} + o(x^5)$ .

– Développement limité de  $f_2$  à l'origine :

$$\begin{aligned} f_2(x) &= \frac{1}{3} \left(8 \left(\frac{x}{2} - \frac{x^3}{3!8} + \frac{x^5}{5!32} + o(x^5)\right) - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)\right)\right) \\ &= \frac{1}{3} \left(3x - \frac{3}{4} \frac{x^5}{5!} + o(x^5)\right) = x - \frac{x^5}{480} + o(x^5) \end{aligned}$$

– Développement limité de  $f_3$  à l'origine :

$$\begin{aligned} f_3(x) &= \sin x (\cos x)^{-1/3} = x \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)^{-1/3} \\ &= x \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72} + \frac{x^4}{18} + o(x^4)\right) \\ &= x \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) \\ &= x \left(1 + x^4 \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{36} + \frac{1}{120}\right) + o(x^4)\right) = x + \frac{x^5}{45} + o(x^5) \end{aligned}$$