

## Méthode de Simpson pour des intégrales doubles

Soit  $f$  une application continue sur le segment  $[a, b]$ . La méthode de Simpson consiste à prendre pour valeur approchée de l'intégrale  $\int_a^b f(t) dt$  la quantité  $\frac{b-a}{6} \left[ f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$ .

En généralisant cette idée, on se propose de calculer une valeur approchée de  $\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy$ , où  $f$  est une application continue sur le rectangle  $\Delta = [a, A] \times [b, B]$  et à valeurs réelles.

1. On partage  $\Delta$  en quatre rectangles dont les sommets sont les neuf points  $A_{ij}$  de coordonnées  $x_i = a + ih$ ,  $y_j = b + jk$ , où  $i$  et  $j$  variant de 0 à 2, avec  $h = \frac{A-a}{2}$  et  $k = \frac{B-b}{2}$ .

- (a) En utilisant la méthode de Simpson pour calculer  $\int_b^B f(x, y) dy$  et  $\int_a^A f(x, y_j) dx$ , montrer qu'on est conduit à écrire l'approximation :

$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy \approx \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \lambda_{ij} f(x_i, y_j)$$

où  $\lambda_{ij}$  est l'élément de la ligne  $i+1$  et de la colonne  $j+1$  de  $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ . [S]

- (b) Calculer la valeur exacte de  $I = \iint_{\Delta} \frac{dx dy}{1 + y \cos x}$ , où  $\Delta$  désigne l'ensemble des points  $M$  de coordonnées  $x$  et  $y$  vérifiant  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  et  $0 \leq y \leq \frac{1}{2}$ . [S]

- (c) Donner la valeur approchée de  $I$  obtenue à l'aide de la formule vue en 1-a.

Préciser pour cet exemple l'ordre de grandeur de l'erreur due à la méthode. [S]

2. On partage maintenant  $\Delta$  en 16 rectangles, en introduisant les points  $A_{ij} = (x_i, y_j)$  tels que  $x_i = a + ih$ ,  $y_j = b + jk$  avec  $h = \frac{A-a}{4}$  et  $k = \frac{B-b}{4}$ , où  $i$  et  $j$  varient de 0 à 4. Montrer qu'on est conduit à l'approximation :

$$\iint_{\Delta} f(x, y) dx dy \approx \frac{hk}{9} \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 \mu_{ij} f(x_i, y_j)$$

où  $\mu_{ij}$  est l'élément de la ligne  $i+1$  et de la colonne  $j+1$  d'une matrice  $N$ , carrée d'ordre 5, que l'on précisera.

Appliquer cette approximation à l'intégrale  $I = \iint_{\Delta} \frac{dx dy}{1 + y \cos x}$ .

Préciser l'ordre de grandeur de l'erreur de méthode. [S]