



Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit f une application de $\mathcal{P}(E)$ dans \mathbb{R} .

On suppose que pour toutes parties A et B disjointes de E , $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$.

Montrer que $f(\emptyset) = 0$.

Prouver que pour toutes parties A et B de E , $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$.

EXERCICE 2 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit f une application de E dans F .

Montrer que pour toute partie A de E , $f(\overset{\perp}{f}(B) \cap A) = B \cap f(A)$.

EXERCICE 3 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit f une application de E dans E .

Montrer que f est bijective \Leftrightarrow pour toute partie A de E , $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ (on note \overline{A} le complémentaire de A dans E .)

EXERCICE 4 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soient E un ensemble non vide, et A, B deux parties de E .

On note $[A, A \cup B] = \{X \subset E, A \subset X \subset A \cup B\}$ et $[A \cap B, B] = \{Y \subset E, A \cap B \subset Y \subset B\}$.

On définit $f : [A, A \cup B] \rightarrow [A \cap B, B]$ par $f(X) = X \cap B$.

On définit $g : [A \cap B, B] \rightarrow [A, A \cup B]$ par $g(Y) = Y \cup A$.

Montrer que f et g sont des bijections réciproques l'une de l'autre.

EXERCICE 5 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit f une application de E dans F .

On définit l'application $g : \mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ par : $\forall Y \subset F, g(Y) = \overset{\perp}{f}(Y)$.

1. Montrer que g est injective $\Leftrightarrow f$ est surjective.
2. Montrer que g est surjective $\Leftrightarrow f$ est injective.

EXERCICE 6 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit f une application de E dans F . Montrer l'équivalence de :

- (a) f est injective
- (b) Pour toutes parties A et B de E , $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.