



Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

Calculer le nombre de couples (A, B) tels que :

1. $A \subset B \subset E$ (on pourra donner deux démonstrations.)
2. $A \subset E, B \subset E, A \cap B = \emptyset$.
3. $A \subset E, B \subset E, A \cap B \neq \emptyset$.

EXERCICE 2 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

- Combien existe-t-il de partitions (A, B) de E en deux parties? ($A \cup B = E$ et $A \cap B = \emptyset$.)
- Combien existe-t-il de *recouvrements* (A, B) de E en deux parties? ($A \cup B = E$.)

EXERCICE 3 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

Calculer le nombre de triplets (A, B, C) tels que $A \cup B \cup C = E$.

EXERCICE 4 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

Calculer $\sum_{X, Y \subset E} \text{card}(X \cap Y)$ et $\sum_{X, Y \subset E} \text{card}(X \cup Y)$.

EXERCICE 5 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soit E un ensemble fini de cardinal np .

Calculer le nombre de partitions de E en n parties de p éléments.

Indications ou résultats

INDICATION POUR L'EXERCICE 1 [Retour à l'énoncé]

1. Discuter suivant le cardinal k de A . Le nombre de solutions au problème posé est 3^n .
Autre idée : il y a autant de solutions qu'il y a d'applications de E dans $\{1, 2, 3\}$.
2. Compte tenu de la question précédente, le nombre solutions est $4^n - 3^n$.
3. Etant donné $A \subset E$, il y a autant de parties contenant A que de parties disjointes de A .
Le nombre de solutions à la question posée est 3^n .

INDICATION POUR L'EXERCICE 2 [Retour à l'énoncé]

- Se donner une partition (A, B) , c'est se donner A .
- Discuter suivant le cardinal k de A . Le nombre de recouvrements est 3^n .

INDICATION POUR L'EXERCICE 3 [Retour à l'énoncé]

Il revient au même de résoudre $\begin{cases} A \cup B = X \\ X \cup C = E \end{cases}$, où $X \subset E$.

Discuter suivant $\text{Card } X = k$ en utilisant l'exercice précédent.

Le nombre de solutions est 7^n .

INDICATION POUR L'EXERCICE 4 [Retour à l'énoncé]

$$- A = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(X \cap Y) = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(\overline{X} \cap Y) = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(X \cap \overline{Y}) = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(\overline{X} \cap \overline{Y})$$

On trouve finalement $A = n4^{n-1}$.

$$- B = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(X \cup Y) = \sum_{X, Y \subset E} \text{Card}(\overline{X \cap Y}) = \sum_{X, Y \subset E} (n - \text{Card}(X \cap Y)) = 3n4^{n-1}$$

INDICATION POUR L'EXERCICE 5 [Retour à l'énoncé]

On commence par étudier l'ensemble \mathcal{F} de tous les n -uples $X = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ formés de parties de E deux à deux disjointes, de cardinal p et de réunion E .

Le nombre d'éléments de \mathcal{F} est $\prod_{k=1}^n C_{kp}^p = \frac{(np)!}{(p!)^n}$.

On note ensuite que l'application $(A_1, A_2, \dots, A_n) \mapsto \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ est une surjection de \mathcal{F} sur l'ensemble \mathcal{G} de toutes les partitions de E en n parties ayant chacune p éléments.

Le principe des bergers donne alors le nombre de partitions : $\frac{(np)!}{n!(p!)^n}$.