

## Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Etudier la suite  $(u_n)$  définie par la relation  $u_{n+1} = \sqrt{8 + \frac{u_n^2}{2}}$ .

EXERCICE 2 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Etudier la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 > 0$  et la relation  $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2u_n}$ .

EXERCICE 3 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Etudier la suite  $(u_n)$  définie par la relation  $u_{n+1} = \frac{1}{14}(3u_n^3 - 3u_n^2 - 4u_n)$ .

EXERCICE 4 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

On définit une application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par :  $f(x) = \begin{cases} (x-4)/2 & \text{sur } ]-\infty, -2] \\ 3(x+1) & \text{sur } [-2, -1] \\ 2(x+1)/3 & \text{sur } [-1, +\infty[ \end{cases}$

On définit une suite  $(u_n)$  par la donnée de  $u_0$  et par la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

Etudier la suite  $(u_n)$  suivant les valeurs de  $u_0$ .

EXERCICE 5 [ [Indication](#) ] [ [Correction](#) ]

Soit  $a$  un réel strictement positif, différent de 1.

On définit une suite  $(u_n)$  de la manière suivante :

- $u_0$  est strictement compris entre  $a$  et 1.
- Pour tout entier  $n$ ,  $u_{n+1} = 1 + a - \frac{a}{u_n}$ .

1. Montrer que la suite  $(u_n)$  est bien définie et que pour tout entier  $n$ , le réel  $u_n$  est strictement compris entre  $a$  et 1.
2. Montrer que la suite  $(u_n)$  est convergente.

## Indications ou résultats

### INDICATION POUR L'EXERCICE 1 [Retour à l'énoncé]

Pour tout entier  $n$ ,  $u_n$  est défini et positif. La seule limite finie possible  $u$  est  $\ell = 4$ .

On discute suivant la position de  $u_0$  par rapport à 0 et 4. Dans tous les cas,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ .

### INDICATION POUR L'EXERCICE 2 [Retour à l'énoncé]

Considérer  $f(x) = \frac{x+3}{2x}$ . La seule limite finie possible est  $\ell = \frac{3}{2}$ .

On est amené à considérer  $a_n = u_{2n}$ ,  $b_n = u_{2n+1}$ , et  $g = f \circ f$ .

On prouve que les suites de terme général  $a_n$  et  $b_n$  sont adjacentes.

### INDICATION POUR L'EXERCICE 3 [Retour à l'énoncé]

On considère  $f(x) = \frac{1}{14}(3x^3 - 3x^2 - 4x)$ , et on factorise  $f(x) - x$ .

Les seules limites finies *possibles* de la suite  $u$  sont  $-2$ ,  $0$ , et  $3$ .

Des trois points fixes, seul  $0$  est "attractif". Les deux autres sont "répulsifs".

On discute suivant la position de  $u_0$  par rapport à  $-2$ ,  $0$  et  $3$  :

- Si  $-2 < u_0 < 3$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
- Si  $u_0 \in \{-2, 3\}$ , la suite est constante.
- Si  $u_0 < -2$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .
- Si  $u_0 > 3$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

### INDICATION POUR L'EXERCICE 4 [Retour à l'énoncé]

L'application  $f$  est affine par morceaux. Tracer  $y = f(x)$ , et comparer  $f(x)$  à  $x$ .

Il y a trois limites finies *possibles* :  $-4$ ,  $-\frac{3}{2}$  et  $2$ .

- Si  $u_0 < -\frac{3}{2}$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -4$ .
- Si  $u_0 = -\frac{3}{2}$  alors la suite  $u$  est constante.
- Si  $u_0 > -\frac{3}{2}$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ .

### INDICATION POUR L'EXERCICE 5 [Retour à l'énoncé]

1. Procéder par récurrence.
2. Les seules limites finies *possibles* de la suite  $u$  sont  $1$  et  $a$ .

La suite  $u$  est croissante et bornée, donc...

## Corrigés des exercices

### CORRIGÉ DE L'EXERCICE 1 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

Pour tout entier  $n$ , il est clair que  $u_n$  est défini et positif.

La suite  $u$  est définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$ , où  $f(x) = \sqrt{8 + \frac{x^2}{2}}$ .

L'application  $f$  étant paire, on peut se contenter d'étudier le cas où  $u_0 \geq 0$ .


L'application  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}^+$ .

Pour tout  $x \geq 0$ , on a  $f(x) - x = \sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} - x = \frac{1}{2} \frac{16 - x^2}{\sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} + x} = \frac{1}{2} \frac{(4 - x)(4 + x)}{\sqrt{8 + \frac{x^2}{2}} + x}$ .

On en déduit le signe de  $f(x) - x$ , et l'équivalence  $f(x) = x \Leftrightarrow x = 4$ .

La seule limite finie possible de la suite  $u$  est donc  $\ell = 4$ .

Voici la courbe  $y = f(x)$ , avec la bissectrice  $y = x$ .



On peut alors conclure suivant la valeur de  $u_0$ .

– Si  $0 \leq u_0 < 4$  : Pour tout  $x$  de  $[0, 4[$ , on a  $0 \leq x < f(x) < 4$ .

En particulier  $0 \leq u_0 < u_1 < 4$  et  $0 \leq u_1 < u_2 < 4$ .

Une récurrence évidente donne alors :  $\forall n \geq 0, 0 \leq u_n < u_{n+1} < 4$ .

La suite  $u$ , croissante et majorée, converge vers 4 (seule limite possible).

– Si  $u_0 = 4$  : La suite  $u$  est constante :  $\forall n \geq 0, u_n = 4$ .

– Si  $4 < u_0$  : Pour tout  $x$  de  $]4, +\infty[$ , on a  $4 < f(x) < x$ .

En particulier  $4 < u_1 < u_0$  et  $4 < u_2 < u_1$ .

Une récurrence évidente donne alors :  $\forall n \geq 0, 4 < u_{n+1} < u_n$ .

La suite  $u$ , décroissante et minorée, converge vers 4 (seule limite possible).

– Si  $u_0 \leq 0$  : On a alors  $u_1 \geq 0$  et on est ramené aux cas précédents.

– Conclusion : Dans tous les cas, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ .