

Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Calculer la dérivée de $f(x) = \arctan \frac{\sqrt{a^2 - b^2} \sin x}{b + a \cos x}$

EXERCICE 2 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Calculer la dérivée de $f(x) = \arccos \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}$.

EXERCICE 3 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Trouver une expression de la somme $S_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$.

EXERCICE 4 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Calculer la dérivée de $f(x) = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ et expliquer le résultat.

EXERCICE 5 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soient $k \leq n$ dans \mathbb{N} . En utilisant $f_k(x) = \sum_{p=1}^n (-1)^p p^k x^p C_n^p$, calculer $A(n, k) = \sum_{p=1}^n (-1)^p p^k C_n^p$.

EXERCICE 6 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Quel est le nombre de solutions dans \mathbb{R} de l'équation : $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = 0$?

Indications ou résultats

INDICATION POUR L'EXERCICE 1 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

On trouve $f'(x) = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b \cos x + a}$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 2 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

On trouve $f'(x) = \frac{2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$ si $x < 0$ et $f'(x) = \frac{-2nx^{n-1}}{x^{2n} + 1}$ si $x > 0$.

Discuter la dérivabilité en $x = 0$ suivant les valeurs de n .

INDICATION POUR L'EXERCICE 3 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

Observer que $S_n(x) = (1 + x + x^2 + \dots + x^n)'$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 4 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

On trouve : $\forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

On en déduit $f(x) = \arcsin x$ sur $] -1, 1[$.

Ce résultat peut être obtenu en posant $\theta = \arcsin x$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 5 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

Remarquer que $f_k(1) = A(n, k)$, et que (pour $k \in \{1, \dots, n\}$) on a : $f_k(x) = x f'_{k-1}(x)$.

En déduire $f_k(x) = (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} x^k (1-x)^{n-k} + o((1-x)^{n-k})$ par récurrence.

Finalement $A(n, 0) = -1$, $A(n, n) = (-1)^n n!$ et $A(n, k) = 0$ si $1 \leq k \leq n-1$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 6 [\[Retour à l'énoncé\]](#)

Poser $f_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$. On a $f'_{n+1}(x) = f_n(x)$ et $f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$.

Montrer par récurrence que $f_{2n}(x) > 0$ sur \mathbb{R} , et que $f_{2n+1}(x) = 0$ a une seule solution dans \mathbb{R} .