

Énoncés des exercices

EXERCICE 1 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

$$\text{Calculer } D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_0 & \cos 2\theta_0 & \dots & \cos n\theta_0 \\ 1 & \cos \theta_1 & \cos 2\theta_1 & \dots & \cos n\theta_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \theta_n & \cos 2\theta_n & \dots & \cos n\theta_n \end{vmatrix}$$

EXERCICE 2 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

$$\text{Calculer le déterminant } \Delta_n(\theta) \text{ de } A_n = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \text{ avec : } \begin{cases} a_{ii} = 2 \\ a_{i-1, j} = a_{i+1, j} = \cos \theta \\ a_{ij} = 0 \text{ dans les autres cas} \end{cases}$$

EXERCICE 3 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

$$\text{Calculer le déterminant } \begin{vmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{vmatrix}.$$

EXERCICE 4 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

$$\text{Soient } A, B \text{ dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}). \text{ Montrer que } \begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} = |\det(A + iB)|^2.$$

EXERCICE 5 [[Indication](#)] [[Correction](#)]

Soient A, B, C trois matrices carrées d'ordre n .

$$\text{Calculer le déterminant } D = \begin{vmatrix} 0 & B \\ A & C \end{vmatrix} \text{ en fonction des déterminants de } A \text{ et de } B.$$

Indications ou résultats

INDICATION POUR L'EXERCICE 1 [Retour à l'énoncé]

Justifier l'existence d'un polynôme P_m , de degré m , tel que $\cos m\theta = P_m(\cos \theta)$.

Vérifier que le coefficient dominant de P_m est 2^{m-1} .

Montrer que par soustractions successives de colonnes, le déterminant D_{n+1} se ramène à un déterminant de Van Der Monde. En déduire $D_{n+1} = 2^{\frac{(n-1)n}{2}} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (\cos \theta_j - \cos \theta_i)$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 2 [Retour à l'énoncé]

Développe $\Delta_n(\theta)$ par rapport à sa première ligne.

En déduire $\Delta_n(\theta) = 2\Delta_{n-1}(\theta) - \cos^2 \theta \Delta_{n-2}(\theta)$.

– Si $\sin \theta \neq 0$, on trouve $\Delta_n(\theta) = \frac{(1 + \sin \theta)^{n+1} - (1 - \sin \theta)^{n+1}}{2 \sin \theta}$.

– Si $\theta = k\pi$, on trouve $\Delta_n(k\pi) = n + 1$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 3 [Retour à l'énoncé]

Pour $j \in \{1, \dots, n\}$, ajouter C_{n+j} à C_j .

Pour i allant de 1 à n , ajouter ensuite L_{n+i} à L_i .

On trouve $D_{2n} = 1$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 4 [Retour à l'énoncé]

Pour k dans $\{1, \dots, n\}$, effectuer $C_k \leftarrow C_k + iC_{n+k}$.

Pour tout k compris entre 1 et n , effectuer $L_{n+k} \leftarrow L_{n+k} - iL_k$.

En déduire $D_{2n} = \det(A + iB) \det(A - iB)$.

INDICATION POUR L'EXERCICE 5 [Retour à l'énoncé]

Pour tout i de $\{1, \dots, n\}$, échanger L_i et L_{n+i} .

On trouve $D_{2n} = (-1)^n \det A \det B$.