

Une étude de suite récurrente

On pourra admettre le résultat suivant (égalité des accroissements finis) :

Soit I un intervalle de \mathbb{R} et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable.

Soient x et y deux éléments de l'intervalle I , avec $x < y$.

Alors il existe un réel c dans $]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = (y - x)f'(c)$.

Soit λ un nombre réel strictement positif.

Soit f l'application définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = x + \lambda \left(\frac{1}{8} - x^3\right)$.

Soit a un réel. On définit une suite u par $u_0 = a$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. (a) Si la suite u est convergente dans \mathbb{R} , quelle est sa seule limite possible ? [S]
 (b) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R} : x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \geq x$ et $x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \leq x$. [S]
2. Dans les questions 2, 3, 4, on suppose $0 < \lambda \leq \frac{4}{7}$, et $0 \leq a \leq 1$.
 (a) Montrer que $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{2}$ et que $\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq f(x)$. [S]
 (b) Préciser la monotonie et la limite de la suite u , suivant les valeurs de a . [S]
3. (a) Montrer que si $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ alors a $0 \leq f(x) - \frac{1}{2} \leq (x - \frac{1}{2}) f'(\frac{1}{2})$. [S]
 (b) En déduire que si $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$ alors : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{4}\lambda\right)^n$. [S]
4. (a) Montrer que si $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ alors a $0 \leq \frac{1}{2} - f(x) \leq (\frac{1}{2} - x) f'(x)$. [S]
 (b) En déduire que si $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$ alors : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \frac{1}{2} - u_n \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{64}\lambda^3\right)^{n-1}$. [S]
5. Dans cette question, on suppose que $\frac{4}{7} < \lambda \leq \frac{8}{7}$, et toujours $0 \leq a \leq 1$.
 (a) Effectuer une étude soignée des variations de l'application f sur $[0, 1]$.
 On précisera notamment les réels β, γ tels que $\frac{1}{2} < \beta < \gamma$, $f'(\beta) = 0$ et $f(\gamma) = \frac{1}{2}$. [S]
 (b) Montrer que tous les termes u_n de la suite u appartiennent au segment $[0, 1]$. [S]
 (c) Étudier la suite u suivant les valeurs de $u_0 = a$. On précisera en particulier si la suite u est monotone, éventuellement à partir d'un certain rang. [S]
6. Dans cette question, on suppose que $\frac{8}{7} < \lambda < \frac{4}{3}$, et toujours $0 \leq a \leq 1$.
 On pourra réutiliser les calculs de la question (5), et notamment les notations β et γ .
 (a) Étudier les variations de f sur le segment $[-\frac{1}{6}, 1]$.
 On notera δ (sans chercher à le calculer) le réel de $] \gamma, 1[$ tel que $f(\delta) = 0$. [S]
 (b) Étudier la suite u suivant les valeurs de $u_0 = a$. [S]
7. En supposant toujours $0 \leq a \leq 1$, étudier la suite u quand $\lambda = \frac{4}{3}$.
 On illustrera graphiquement la convergence pour une valeur donnée de $u_0 = a$. [S]

Corrigé du problème

1. (a) Si la suite u converge vers un réel ℓ , alors, on obtient $f(\ell) = \ell$ par passage à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ (en effet f est définie sur \mathbb{R} , et continue.)
 Mais on a les équivalences : $f(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ell = \ell + \lambda \left(\frac{1}{8} - \ell^3\right) \Leftrightarrow \ell^3 = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \ell = \frac{1}{2}$.
 Donc si la suite u converge, sa limite est nécessairement $\frac{1}{2}$. [Q]
- (b) Pour tout x de \mathbb{R} , $f(x) - x = \lambda \left(\frac{1}{8} - x^3\right) = \frac{\lambda}{4} \left(\frac{1}{2} - x\right) (4x^2 + 2x + 1)$.
 Le trinôme $4x^2 + 2x + 1 = 3x^2 + (x + 1)^2$ reste strictement positif sur \mathbb{R} .
 On en déduit (puisque $\lambda > 0$) que $f(x) - x$ a le signe de $\frac{1}{2} - x$.
 Autrement dit : $x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \geq x$ et $x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \leq x$. [Q]
2. (a) Pour tout x de \mathbb{R} , on a $f(x) - \frac{1}{2} = \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{4}(4x^2 + 2x + 1)\right)$.
 Pour tout x de $[0, 1]$, on a $\frac{\lambda}{4}(4x^2 + 2x + 1) \leq \frac{7\lambda}{4} \leq 1$.
 On en déduit que sur $[0, 1]$, la quantité $f(x) - \frac{1}{2}$ a le signe de $x - \frac{1}{2}$.
 Autrement dit : $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{2}$, et $\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq f(x)$. [Q]
- (b) On utilise les résultats obtenus dans les deux questions précédentes.
 On a en particulier l'implication $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq x \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$.
 De même, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq f(x) \leq x \leq 1$.
 Compte tenu de la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, et par des récurrences évidentes, on en déduit alors les résultats suivants, en fonction de la valeur de $u_0 = a$:
 - Si $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$, alors pour tout n , on a les inégalités : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$.
 La suite u , croissante et majorée, converge vers $\frac{1}{2}$ (seule limite possible.)
 - Si $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$, alors pour tout n , on a les inégalités : $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
 La suite u , décroissante et minorée, converge vers $\frac{1}{2}$ (seule possibilité.)
 - Bien sûr, si $a = \frac{1}{2}$, la suite u est constante en $\frac{1}{2}$.
 [Q]
3. (a) Le résultat est évident si $x = \frac{1}{2}$. On suppose donc $\frac{1}{2} < x \leq 1$.
 On utilise l'égalité des accroissements finis, rappelée dans l'énoncé.
 Il existe donc c_x dans $]\frac{1}{2}, x[$ tel que : $f(x) - \frac{1}{2} = f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(c_x)$.
 Or $f' : t \mapsto 1 - 3\lambda t^2$ est décroissante sur $[0, 1]$. Ainsi $f'(c_x) \leq f'\left(\frac{1}{2}\right)$.
 Puisque $f(x) \geq \frac{1}{2}$, on a donc obtenu : $0 \leq f(x) - \frac{1}{2} \leq \left(x - \frac{1}{2}\right) f'\left(\frac{1}{2}\right)$. [Q]
- (b) Si $\frac{1}{2} \leq u_0 = a \leq 1$, on sait que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$. De plus $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{3}{4}\lambda$.
 Les égalités $u_{n+1} = f(u_n)$ impliquent alors : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_{n+1} - \frac{1}{2} \leq \left(u_n - \frac{1}{2}\right) f'\left(\frac{1}{2}\right)$.
 Ainsi, par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n - \frac{1}{2} \leq \left(u_0 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{3}{4}\lambda\right)^n \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{4}\lambda\right)^n$. [Q]