



ALGÈBRE BILINAIRE

ÉNONCÉ DE L'EXERCICE

ÉNONCÉ :

On considère $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique B et du produit scalaire canonique associé, que l'on notera $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On notera $\|\cdot\|$ la norme associée. Soit $e = (\alpha, \beta, \gamma)$ un vecteur normé de E . On note D la droite vectorielle engendrée par e .

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et f_a l'application définie sur E par :

$$\forall x \in E, f_a(x) = x + a \langle x, e \rangle e.$$

- 1) Vérifier que f_a est un endomorphisme de E .
- 2) a) Montrer qu'il existe une valeur $b \in \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in E, \|f_b(x)\| = \|x\|$
 b) Calculer $f_b \circ f_b$ et montrer que $\text{Ker}(f_b + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f_b - \text{Id}) = E$.
- 3) On revient au cas général où a est quelconque .
 a) Montrer que f_a est un endomorphisme symétrique de E .
 b) Déterminer les éléments propres de f_a .
- 4) On suppose dans cette question que $a \neq -1$ et on note M_a la matrice de f_a dans la base canonique B . On définit alors sur E l'application h_a par :

$$\forall u = (x, y, z) \in E, h_a(u) = {}^t X M_a X \text{ où } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Déterminer les extremums de h_a .