



PROBABILITÉS DISCRETES

ÉNONCÉ DE L'EXERCICE

ÉNONCÉ :

ÉNONCÉ-15

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, définies sur le même espace probabilisé, telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(p) \text{ où } p \in]0, 1[.$$

On pose $Y_n = X_n \times X_{n+1}$; $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $V_n = \sum_{i=1}^n Y_i$.

1) Calculer les espérances et les variances de S_n et de V_n .

2) a) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et T_1, T_2, Z trois variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé et prenant toutes les trois un nombre fini de valeurs.

Montrer que $\text{cov}(aT_1 + bT_2, Z) = a \text{cov}(T_1, Z) + b \text{cov}(T_2, Z)$.

En déduire que $\text{cov}(Z, aT_1 + bT_2) = a \text{cov}(Z, T_1) + b \text{cov}(Z, T_2)$.

b) Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et T_1, \dots, T_n, Z , $n + 1$ variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé et prenant un nombre fini de valeurs.

Montrer que

$$\text{cov}\left(\sum_{i=1}^n a_i T_i, Z\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \text{cov}(T_i, Z).$$

c) Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ et $T_1, \dots, T_n, Z_1, \dots, Z_n$, $2n$ variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé et prenant un nombre fini de valeurs. Montrer que

$$\text{cov}\left(\sum_{i=1}^n a_i T_i, \sum_{k=1}^n b_k Z_k\right) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq k \leq n}} a_i b_k \text{cov}(T_i, Z_k).$$

3) Calculer $\text{cov}(S_n, V_n)$.

INDICATIONS DE SOLUTION

Question 1–b) : On étudiera l'indépendance des variables Y_i pour le calcul de $V(X_n)$