



EXERCICES DE MATHÉMATIQUES



ALGÈBRE LINÉAIRE

ÉNONCÉ DE L'EXERCICE

ÉNONCÉ :

ÉNONCÉ-21

Soit $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

1) Pour $(i, j) \in (\llbracket 1, 3 \rrbracket)^2$, on considère la matrice $E_{i,j} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont les termes sont tous nuls, sauf celui de la $i^{\text{ème}}$ ligne $j^{\text{ème}}$ colonne qui vaut 1.

Montrer que la famille $E_{1,1}, E_{1,2}, E_{1,3}, E_{2,1}, E_{2,2}, E_{2,3}, E_{3,1}, E_{3,2}, E_{3,3}$ forme une base de E , appelée base canonique et notée \mathcal{B} .

2) Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

On considère l'application $f_A : \begin{cases} \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \\ X & \longmapsto XA. \end{cases}$

a) Vérifier que $f_A \in \mathcal{L}(E)$ et déterminer sa matrice M dans \mathcal{B} .

b) Calculer la trace de M (la trace d'une matrice carrée est la somme de ses termes diagonaux).

On rappelle que la trace d'une matrice est indépendante de la base dans laquelle on écrit cette matrice : c'est la raison pour laquelle on dira aussi trace de l'endomorphisme associé et on la notera $\text{tr } M$ ou $\text{tr } f_A$.

3) Soit $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $g_C : \begin{cases} \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \\ X & \longmapsto XC. \end{cases}$

a) Montrer que, si C est p -nilpotente (c'est-à-dire il existe $p \in \mathbb{N}^* / C^p = (0)$), il en est de même de g_C (c'est-à-dire $\underbrace{g_C \circ \dots \circ g_C}_{p \text{ fois}} = \omega$ où ω est

l'endomorphisme nul).

b) Déterminer la trace de g_C .