



## RESUME DU COURS DE MATHEMATIQUES



ANALYSE

INTEGRATION

PRIMITIVES

INTEGRATION

PRIMITIVES

**DEFINITION :** Soit  $F$  et  $f$  deux applications d'un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  non vide et non réduit à un point, dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ , si  $F' = f$ .

**THEOREME :** Toute fonction, définie, continue sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  admet une primitive sur  $I$ .

**PROPOSITION :** Soit  $f$  est une application continue sur  $I$  et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$ . Alors toutes les primitives de  $f$  sont de la forme  $G : x \mapsto F(x) + k / k \in \mathbb{R}$ .

**Unicité de la primitive prenant en un point donné une valeur donnée**

Soit  $F$  une primitive de  $f$ , application continue sur  $I$ . Considérons un point  $x_0$  de  $I$  et une valeur réelle quelconque  $y_0$ . Alors il existe une unique primitive de  $f$  sur  $I$  qui prend en  $x_0$  la valeur  $y_0$  : c'est l'application  $x \mapsto F(x) - F(x_0) + y_0$ .

**Notation :** La primitive de  $f$  qui s'annule en  $x_0$  se note  $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t)dt$ .

$$\text{On a donc } \forall x \in I, \quad F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f(t)dt.$$

**OPERATIONS**

Si  $f$  et  $g$  sont deux applications continues sur un intervalle  $I$  et  $F$  et  $G$  deux primitives de  $f$  et  $g$  respectivement. Alors

- $F + G$  est une primitive de  $f + g$ .
- Si  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda F$  est une primitive de  $\lambda f$ .
- Si  $f$  et  $g$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $fg$  est une primitive de  $fg' + f'g$ .

## 2 Primitives, Intégration

- Si  $u$  est une application dérivable sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $J$ ,  $f$  est une application dérivable sur un intervalle  $J$  de  $\mathbb{R}$  alors  $f \circ u$  est une primitive de  $f' \circ u \times u'$ .

### PRIMITIVES USUELLES

Tableau des différents résultats

Fonctions	Primitives
$x^n$ où $n \in \mathbb{Z} - \{-1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x  + C$
$\sum_{k=0}^{k=n} a_k x^k$	$\sum_{k=0}^{k=n} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$
$e^x$	$e^x + C$
$x^\alpha$ où $x > 0, \alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$a^x$ où $a > 0, a \neq 1$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$

---

## INTEGRALE D'UNE FONCTION

## CONTINUE SUR UN SEGMENT

---

Soit  $f$  une application continue sur un segment  $[a, b], (a \leq b)$ ,

**DEFINITION :** On appelle *intégrale* (ou *intégrale de Riemann*) de  $f$  sur  $[a, b]$  le nombre réel  $F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$  où  $F$  est une primitive quelconque de  $f$  sur  $[a, b]$ . On dira alors que  $f$  est *intégrable* sur  $[a, b]$ .

C'est la formule fondamentale du calcul intégral.

### PROPRIETES

**RELATION DE CHASLES :** Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle non vide  $I$  et non réduit à un point, et  $x, y, z$  trois éléments de  $I$  :

$$\int_x^z f(t)dt = \int_x^y f(t)dt + \int_y^z f(t)dt.$$

### LINEARITE DE L'INTEGRATION

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur un intervalle non vide  $I$ ,  $\lambda$  et  $\mu$  deux réels quelconques. Alors

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx.$$