



EXERCICES D'INFORMATIQUE



INFORMATIQUE
ENONCE DE L'EXERCICE

ENONCE-37

Le but de l'exercice est, pour une fonction de deux variables réelles f , de

- chercher les points critiques,
- calculer la hessienne en l'un deux, M ,
- construire sur une même figure la surface S d'équation $z = f(x, y)$, le plan tangent à S au point $M(a, b)$, et la surface H d'équation $z = h(x, y)$ avec

$$h(x, y) = f(M) + \langle \nabla f(M), \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \rangle + \frac{1}{2} \left((x - a \quad y - b) H(M) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \right)$$

- observer la position de S par rapport au plan tangent et observer "concrètement" ce que signifie la formule

$$f(x, y) = h(x, y) + o((x - a)^2 + (y - b)^2) \text{ au voisinage de } (a, b)$$

1) _____

$$f(x, y) = 1 + \frac{x^2 + y^2}{2} - x^2 y^2 \text{ pour } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Déterminer les points critiques de f et les extremums éventuels.

2) _____

Ecrire le développement limité de f à l'ordre 2 au voisinage de $M = (0, 0)$
Donner l'équation du plan tangent à la surface S d'équation $z = f(x, y)$ au point M .
Construire sur une première figure, la surface S , le plan tangent et sur une seconde la surface S et la fonction h d'équation

$$z = f(M) + \langle \nabla f(M), \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \rangle + \frac{1}{2} \left((x - a \quad y - b) H(M) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \right).$$

CORRIGE DE L'EXERCICE NUMERO 37

1) _____

f est de classe C^2 sur \mathbb{R}^2 ; pas de problème de dérivation.

$$\partial_1 f(x, y) = x - 2xy^2.$$

$$\partial_2 f(x, y) = y - 2yx^2.$$

Les points critiques sont solutions de $x(1 - 2y^2) = 0$ et $y(1 - 2x^2) = 0$; la résolution donne, sans problème $(0, 0)$, $(x, y) = (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Cela fait 5 points critiques, dont $M = (0, 0)$

$$\nabla f(M) = (\partial_1 f(0, 0), \partial_2 f(0, 0)) = (0, 0).$$

$\partial_{1,1}^2 f(x, y) = 1 - 2y^2$, $\partial_{1,2}^2 f(x, y) = \partial_{2,1}^2 f(x, y) = -4xy$, d'après le théorème de Schwarz, et $\partial_{2,2}^2 f(x, y) = 1 - 2x^2$, donc la hessienne au point (x, y) est

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 1 - 2y^2 & -4xy \\ -4xy & 1 - 2x^2 \end{pmatrix}$$

- En $(0, 0)$, $H(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Il y a une valeur propre unique, 1 : le point $(0, 0)$ est un minimum relatif.

- Aux points $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ et $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, la hessienne est $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

λ est valeur propre si et seulement si $\lambda^2 - 1 = 0 \iff \lambda = 1$ ou $\lambda = -1$. Il n'y a pas d'extremum en ces points.

- Aux points $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ et $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, la hessienne est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

λ est valeur propre si et seulement si $\lambda^2 - 1 = 0 \iff \lambda = 1$ ou $\lambda = -1$. Il n'y a pas d'extremum en ces points.

f présente un unique extremum local au point $O = (0, 0)$. C'est un minimum local.

2) _____

D'après le cours, le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de $(0, 0)$ est

$$f(x, y) = f(0, 0) + \langle \nabla f((0, 0), \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rangle + \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} H(0, 0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) + o(x^2 + y^2)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) + o(x^2 + y^2)$$

$$f(x, y) = 1 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2) ; h(x, y) = 1 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

L'équation du plan tangent à S au point (a, b) est $z = f(a, b) + \langle \nabla f((a, b), \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \rangle ;$

ici le plan tangent à f en $(0, 0)$ pour équation $z = 1$.

function Z=F1(x,y) // équation de S

$$Z=1+(x^2+y^2)/2-(x^2)*(y^2)$$

endfunction

function Z=G1(x,y) // équation du plan tangent

$$Z=1$$

endfunction

function Z=H1(x,y) // surface z=h(x,y)

page 2

Jean MALLET

© EDUKLUB SA

Tous droits de l'auteur des oeuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des oeuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.