



## ORAL DE MATHÉMATIQUES

HEC ESCP

## ANALYSE ENONCE NUMERO 5

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_n$  des réels non tous nuls. On considère les fonctions  $f, g, h$  définies pour  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  par

$$f(x) = \prod_{i=1}^n x_i ; g(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ et } h(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

1-a)

Justifier que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^n$ . Déterminer son gradient en tout point  $x$  de  $\mathbb{R}^n$ .

b) Prouver que  $f$  admet un maximum sur la sphère unité  $S$  de  $\mathbb{R}^n$  définie par

$$S = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$$

c) Déterminer le maximum de  $f$  sur  $S$ .

d) En déduire que pour tout point  $u = (u_1, \dots, u_n)$  de  $\mathbb{R}^n$ , on a

$$\left| \prod_{i=1}^n u_i \right| \leq \left( \frac{\|u\|}{\sqrt{n}} \right)^n$$

où  $\|\cdot\|$  désigne la norme euclidienne canonique sur  $\mathbb{R}^n$ .

2-a)

Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $a_i \neq 0$ . On pose

$$H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / h(x) = 1\} \text{ et } B = \{x \in \mathbb{R}^n / \|x\| \leq \frac{1}{|a_i|}\}$$

Prouver que l'ensemble  $H \cap B$  est non vide puis que c'est un fermé borné de  $\mathbb{R}^n$ .

b) Justifier que la fonction  $g$  admet un minimum sur  $B \cap H$ . Prouver que ce minimum est aussi le minimum de  $g$  sous la contrainte  $h(x) = 1$ .

c) Déterminer le minimum de  $g$  sur  $H$ .